11 schnelle Tipps zur Umstellung auf das Dr. Harrison Alleinfutter

Vögel, die von einer anderen Ernährung auf das Dr. Harrison Alleinfutter umgestellt werden, sollten für einen Zeitraum von mindestens 6 bis 8 Monaten das Dr. Harrison Zuchtfutter (High Potency Formula) bekommen.

1 **Verwenden Sie zwei bis drei Wochen vor der Umstellung den AVIx/HEALx Bird Builder.** Die Gabe von Jod und Spurenelementen fördert einen gesunden Appetit, so dass der Vogel bereit ist, etwas Neues zu probieren. Beenden Sie die Gabe von AVIx/HEALx Bird Builder®, sobald der Vogel mindestens 80% seiner Nahrung durch das Dr. Harrison Futter deckt.

2 **Das Dr. Harrison Vogelbrot ist ein besonders wirksames Hilfsmittel bei der Umstellung.** Die gewohnte Nahrung, die der Vogel bekommt, kann zur Backmischung hinzugefügt und im Brot „eingebacken“ werden. Reduzieren Sie diesen Anteil des alten Futters stufenweise und ersetzen Sie ihn durch die entsprechende Sorte Dr. Harrison Alleinfutter.

3 **Verändern Sie die Umgebung des Vogels.** Versuchen Sie, den Vogel in eine neue Voliere, z.B. in ein Aquarium, einen neuen Käfig oder eine andere Box zu bringen. Entfernen Sie alle Spielsachen, Sitzstangen und Futternäpfe und bieten Sie das Dr. Harrison Zuchtfutter auf einer festen Oberfläche auf dem Boden an.

4 **Benutzen Sie einen Spiegel oder ein weißes Papier.** Speziell bei Wellensittichen funktioniert es gut, die Futterkörnchen über einen Spiegel oder ein weißes Blatt Papier auf dem Boden des Käfigs zu streuen. Ein Vogel, der alt genug ist, um vergesellschaftet zu werden, kann aus Futterneid mit dem „Rivalen“ im Spiegel beginnen zu fressen. Ein weißes Papier als Hintergrund lenkt die Aufmerksamkeit des Vogels auf die Futterkörnchen.



5 **Entwöhnen Sie Ihren Vogel langsam von Körnermischungen.** Bieten Sie am Abend die gewohnte Körnermischung für maximal eine Stunde in einem Futternapf an. Dann entfernen Sie die Körnermischung und ersetzen Sie sie durch Zuchtfutter. Am nächsten Tag geben Sie die Körnermischung für nur 30 Minuten am Morgen und am Abend. Am dritten Tag reduzieren Sie die Zeit auf 15 Minuten zweimal täglich. Letztendlich bieten Sie am vierten Tag nur noch das Zuchtfutter an. Beobachten Sie die Ausscheidungen Ihres Vogels.

Bitte beachten Sie: Das Gewicht des Vogels in Gramm, das körperliche Wohlbefinden, das Verhalten und die Ausscheidungen sollten sorgfältig beobachtet werden – bei kleineren und mittelgroßen Vögeln täglich, mindestens zweimal wöchentlich bei großen Vögeln.

6 **Füttern Sie Ihren Vogel zu den Mahlzeiten.** Stellen Sie das Futter auf einen Teller, rühren Sie mit dem Finger oder einem Löffel darin um und tun Sie so, als ob Sie es vor seinen Augen selbst essen.

7 **Bieten Sie Umstellungsfutter, Erhaltungsfutter Pepper oder Erhaltungsfutter extra fein an.** Vögel lieben den Geschmack von Umstellungsfutter und Erhaltungsfutter Pepper. Diese Futtersorten können für kleinere Vogelarten etwas zerkleinert werden. Erhaltungsfutter extrafein hat auch einen reizvollen Geschmack, der dazu beitragen kann, dass Ihr Vogel das neue Futter probiert.

8 **Benutzen Sie einen Trainervogel zur Umstellung.** Bringen Sie Ihren Vogel neben einem anderen Vogel unter, der bereits das Dr. Harrison Alleinfutter frisst, oder benutzen Sie einen Trainervogel als Vorbild im selben Käfig.

9 **Erwärmen Sie das Futter oder feuchten Sie es an.** Erhitzen Sie das Futter leicht oder feuchten Sie es mit einer kleinen Menge Fruchtsaft oder AVIx/HEALx Sunshine Factor® leicht an.

10 **Vereinbaren Sie eine überwachte Futterumstellung mit Ihrem Tierarzt.** Einige Vögel erkennen das Dr. Harrison Alleinfutter nicht als Futter an, und eine Unterbringung bei Ihrem Tierarzt, wo eine genaue Überwachung gewährleistet ist, kann helfen, den Vogel gesund durch die Umstellungsphase zu bringen.

11 **Wenn die Umstellungstipps beim ersten Mal nicht funktionieren,** können Sie das gewohnte Futter für kurze Zeit weiter geben und es danach noch einmal versuchen. Die Mühe ist es wert für eine langfristige Gesundheit Ihres Vogels.

Wie Sie die Ausscheidungen Ihres Vogels beurteilen können

Normale Ausscheidungen



Benutzen Sie sauberes weißes Papier oder eine andere glatte Oberfläche, um Ausscheidungen Ihres Vogels zu sammeln. Normalerweise sollte der Kot weich und braun sein, wenn der Vogel eine ausgewogene Futtermischung zu sich nimmt, aber er kann auch unnatürlich trocken und schwarz, gelb oder grünlich sein, wenn der Vogel nur Körnermischungen frisst. Der normalerweise klare Urin kann vermehrt abgesondert werden, wenn der Vogel zu viel Obst und Gemüse zu sich nimmt. Normale Urate sind eine cremige, weiße Paste von der Niere und sind oft im flüssigen Harn aufgelöst oder um den Kot „gewickelt". Jede Art von Farbveränderung in den Uraten ist nicht normal. Bei einem kranken Vogel sind möglicherweise Menge, Farbe, Konsistenz und Häufigkeit des Kotabsatzes verändert. Kot von eierlegenden Weibchen, Jungvögeln, die Handaufzuchtfutter bekommen, und der erste Kot am Morgen können größer sein als gewöhnlich, und die Menge Urin kann ansteigen, wenn der Vogel nervös oder krank ist.

Sichtbare Ergebnisse



Import into the EU and distribution within Germany: AVIFOOD Dipl. Stat. (Univ.) Monika Janeczek e. K.
Hans-Cornelius-Str.2b, D-82166 Gräfelfing, www.avifood.com, Phone: +49-(0)89-854 814-60; Fax: -50; email: info@avifood.com

Distribution outside of Germany: AVIJAN OHG
Hans-Cornelius-Str.2c, D-82166 Gräfelfing, www.avijan.com, Phone: +49-(0)89-854-9000; Fax: -854 4600; email: info@avijan.com