11 Consigli rapidi per la conversione alle diete aviari della Harrison's

Gli uccelli che effettuano la conversione da qualisiasi altra dieta devono essere alimentati con Harrison's High Potency™ Formula per un periodo di almeno 6-8 mesi.

1 **Usare Bird Builder® da 2-3 settimane prima** del cambiamento della dieta. Lo iodio e gli oligo-elementi nel Builder favoriscono un sano appetito, risultando in una buona disposizione dell'uccello a provare qualcosa di nuovo. Si consiglia di smettere di usare il Builder una volta che l'uccello sta mangiando almeno per l'80% o piu' della razione la nuova dieta.

2 **La miscela per pane aviare Harrison's Bird Bread Mix™** e' uno strumento di conversione estremamente efficace. L'alimento che l'uccello mangia normalmente deve essere aggiunto nella miscela e quindi cotto nel pane. Gradualmente ridurre la quantita' del vecchio alimento e rimpiazzarlo con la formula appropriata della Harrison's.

3 **Cambiare l'ambiente dell'animale.** Provare a muovere il proprio uccello in un nuovo ambiente, come un box, un acquario o anche una gabbia nuova. Togliere tutti i giochi, i posatoi e le ciotole e offrire High Potency™ sul fondo.

4 **Usare uno specchio o carta bianca.** Spargere il cibo su uno speccchio o carta bianca funziona bene soprattutto per i pappagallini ondulati. Un uccello abbastanza maturo per essere socializzato potrebbe mangiare per competere con il "rivale" nello specchio. La carta bianca attira l'attenzione sul cibo.



5 **Lentamente "svezza" il tuo uccello dai semi.** La sera, offri semi dalla ciotola del cibo solo per 1 ora. Poi, togli i semi e rimpiazzali con High Potency.™ Il giorno successivo dai al tuo uccello semi solo per 30 minuti la mattina e la sera. Il terzo giorno riduci il tempo a 15 minuti due volte al giorno. Finalmente il quarto giorno dai solo High Potency.™ Controlla le feci dell'animale.

Nota: Il peso dell'uccello (in grammi), la condizione corporea, il comportamento e le feci devono essere monitorate attentamente su base giornaliera in specie piccole e medie e almeno due volte a settimana in uccelli grandi.

6 Nutri il tuo uccello all'ora dei pasti.

Piazza il cibo su un piatto, muovilo intorno con il dito o un cucchiaio e fai finta di mangiarlo davanti al tuo uccello.

7 Offri Power Treats,™ Pepper Lifetime Coarse™ o Adult Lifetime Mash.™

Gli uccelli amano il sapore di Power Treats™ e Pepper Lifetime Coarse.™ Questi prodotti estrusi possono essere sbriciolati per gli uccelli piu' piccoli. Anche Adult Lifetime Mash™ ha un sapore invitante, di aiuto per il tuo uccello a provare un nuovo alimento.

8 Usa un uccello gia' convertito come esempio da seguire.

Mettilo vicino ad un altro che sta' gia' mangiando le diete della Harrison's o poni nella stessa gabbia un altro volatile che sta' gia' mangiando la dieta come esempio da seguire per l'alimentazione.

9 Riscalda o inumidisci l'alimento.

Scalda l'High Potency™ leggermente o inumidiscilo con una piccola quantità di succo di frutta o Sunshine Factor.®

10 Programma un cambiamento di dieta supervisionato

dal tuo veterinario. Alcuni uccelli non riconoscono Harrison's come cibo e ricoverarli in una clinica dove possano essere monitorati aiutera' il tuo' uccello durante il processo di conversione.

11 Se le tecniche di conversione non funzionano la prima volta,

puoi offrire il cibo familiare per un breve periodo e poi provare di nuovo. L'impegno nel riuscire ha valore per la salute del tuo volatile.

Come valutare le feci del tuo volatile

Carta bianca pulita o altre superfici lisce possono essere utilizzate per raccogliere le feci. L'apparenza normale delle feci e' di solito soffice e marrone quando l'uccello mangia una dieta formulata ma potrebbe essere anormalmente secca e nera, gialla o verde con una dieta a base di semi. L'urina normalmente chiara potrebbe essere aumentata in quantita' per eccessivo consumo di frutti e verdure. Gli urati normali sono cremosi e bianchi prodotti di rifiuto provenienti dai reni e sono spesso sospesi nell' urina liquida o "avvolti attorno" alle feci. Qualisiasi cambiamento di colore degli urati e' anormale. Un uccello malato potrebbe avere un cambiamento di volume, colore, consistenza o frequenza delle deiezioni. Le feci da femmine che stan deponendo le uova, i giovani uccelli alimentati con formula per allevamento a mano e la prima evacuazione al mattino potrebbero essere piu' grandi del normale e la quantita' di urina aumentare quando l'uccello e' nervoso o ammalato.

Feci Normali



Risultati che vedrai

Import into the EU and distribution within Germany: AVIFOOD Dipl. Stat. (Univ.) Monika Janeczek e. K.
Hans-Cornelius-Str.2b, D-82166 Gräfelfing, www.avifood.com, Phone: +49-(0)89-854 814-60; Fax: -50; email: info@avifood.com

Distribution outside of Germany: AVIJAN OHG
Hans-Cornelius-Str.2c, D-82166 Gräfelfing, www.avijan.com, Phone: +49-(0)89-854-9000; Fax: -854 4600; email: info@avijan.com